

**添付資料-10 陸稻（NERICA）栽培適
地区分図（32 カ国）**

目次


添付資料－10 陸稻（NERICA）栽培適地区分図（32 カ国）

添付資料－10-1 (1)～(4)	カメルーン.....	X-1
添付資料－10-2 (1)～(4)	ガーナ.....	X-5
添付資料－10-3 (1)～(4)	ギニア.....	X-9
添付資料－10-4 (1)～(4)	ケニア.....	X-13
添付資料－10-5 (1)～(4)	マダガスカル.....	X-17
添付資料－10-6 (1)～(4)	マリ.....	X-21
添付資料－10-7 (1)～(4)	モザンビーク.....	X-25
添付資料－10-8 (1)～(4)	ナイジェリア.....	X-29
添付資料－10-9 (1)～(4)	セネガル.....	X-33
添付資料－10-10 (1)～(4)	シエラレオネ.....	X-37
添付資料－10-11 (1)～(4)	タンザニア.....	X-41
添付資料－10-12 (1)～(4)	ウガンダ.....	X-45
添付資料－10-13 (1)～(4)	ベナン.....	X-49
添付資料－10-14 (1)～(4)	ブルキナファソ.....	X-53
添付資料－10-15 (1)～(4)	中央アフリカ.....	X-57
添付資料－10-16 (1)～(4)	コンゴ民主共和国.....	X-61
添付資料－10-17 (1)～(4)	コートジボワール.....	X-65
添付資料－10-18 (1)～(4)	エチオピア.....	X-69
添付資料－10-19 (1)～(4)	ガンビア.....	X-73
添付資料－10-20 (1)～(4)	リベリア.....	X-77
添付資料－10-21 (1)～(4)	ルワンダ.....	X-81
添付資料－10-22 (1)～(4)	トーゴ.....	X-85
添付資料－10-23 (1)～(4)	ザンビア.....	X-89
添付資料－10-24 (1)～(4)	アンゴラ.....	X-93
添付資料－10-25 (1)～(4)	ブルンジ.....	X-97
添付資料－10-26 (1)～(4)	チャド.....	X-101
添付資料－10-27 (1)～(4)	コンゴ共和国.....	X-105

添付資料－10-28 (1)～(4)	ガボン.....	X-109
添付資料－10-29 (1)～(4)	ギニアビザウ.....	X-113
添付資料－10-30 (1)～(4)	マラウイ.....	X-117
添付資料－10-31 (1)～(4)	ニジェール.....	X-121
添付資料－10-32 (1)～(4)	スーダン.....	X-125


※(1) 多雨年第 1 雨期播種、(2) 多雨年第 2 雨期播種、(3) 少雨年第 1 雨期播種、(4) 少雨年第 2 雨期播種

カメルーン国の陸稲(NERICA)栽培適地区分図
多雨年:2010年 第1雨期播種




カメルーン国の陸稲(NERICA)栽培適地区分図

多雨年:2010年 第2雨期播種




カメルーン国の陸稲 (NERICA) 栽培適地区分図 少雨年: 2015年 第1雨期播種




カメルーン国の陸稲 (NERICA) 栽培適地区分図


少雨年: 2015年 第2雨期播種



ガーナ国の陸稲(NERICA)栽培適地区分図 多雨年:2010年 第1雨期播種




ガーナ国の陸稲 (NERICA) 栽培適地区分図 多雨年: 2010年 第2雨期播種




- 凡例**
- | | | | |
|---|--|--|----------------------------|
| 天候栽培推奨
干ばつリスク低、土壌pH良
(半旬雨量: >25mm,
pH: >5.5-7.0) | 天候栽培不適
(半旬雨量: <15mm) | 栄養成長期の生育不良
リスク中以上
(播種後0-55日の平均
気温: <19°C or >40°C) | 河川、湖沼 |
| 天候栽培推奨
干ばつリスク低、土壌pH適
(半旬雨量>25mm,
pH: >4.5-5.5) | 高温不稔リスク中以上
(播種後55-75日の平均
気温: >35°C) | 登熟期の登熟障害リスク
リスク中以上
(播種後76-100日の平均
気温: <20°C or >36°C) | 首都、主要都市 |
| 天候栽培可能
干ばつリスク中~高
(半旬雨量: 15-25mm) | 障害型冷害リスク中以上
(播種後55-75日の平均
気温: <22°C) | 自然保護地域等*1 | 主要道路 |
| | | 国境、行政界 | ダム (灌漑用途含)*2
" (灌漑用途外) |
| | | | 既存農地 (畑地等)*3
" (湿地、水田等) |


*1: IUCN management Category (Ia, Ib, II, III, IV), World Conservation Monitoring Centre.
*2: Geo-reference database on dams in Africa, FAO AQUASTA.
*3: Sentinel-2 10m land cover time series of the world from 2017-2021, Impact Observatory, Microsoft and Esri.




ガーナ国の陸稲(NERICA)栽培適地区分図 少雨年:2015年 第1雨期播種



ガーナ国の陸稲(NERICA)栽培適地区分図 少雨年:2015年 第2雨期播種




ギニア国の陸稲 (NERICA)栽培適地区分図
多雨年: 2006年 第1雨期播種




ギニア国の陸稲(NERICA)栽培適地区分図


多雨年:2006年 第2雨期播種




ギニア国の陸稲(NERICA)栽培適地区分図 少雨年:2010年 第1雨期播種




ギニア国の陸稲(NERICA)栽培適地区分図 少雨年:2010年 第2雨期播種




ケニア国の陸稲(NERICA)栽培適地区分図 多雨年:2006年 第1雨期播種




ケニア国の陸稲(NERICA)栽培適地区分図 多雨年:2006年 第2雨期播種



ケニア国の陸稲(NERICA)栽培適地区分図 少雨年:2010年 第1雨期播種




ケニア国の陸稲 (NERICA) 栽培適地区分図 少雨年: 2010年 第2雨期播種




マダガスカル国の陸稲(NERICA)栽培適地区分図


多雨年:2015年 第1雨期播種




マダガスカル国の陸稲(NERICA)栽培適地区分図 多雨年:2015年 第2雨期播種




マダガスカル国の陸稲(NERICA)栽培適地区分図 少雨年:2010年 第1雨期播種



マダガスカル国の陸稲(NERICA)栽培適地区分図 少雨年:2010年 第2雨期播種




マリ国の陸稲 (NERICA)栽培適地区分図 多雨年:2010年 第1雨期播種




マリ国の陸稲(NERICA)栽培適地区分図

多雨年:2010年 第2雨期播種




マリ国の陸稲(NERICA)栽培適地区分図

少雨年:2011年 第2雨期播種




モザンビーク国の陸稲(NERICA)栽培適地区分図

多雨年:2006年 第1雨期播種




モザンビーク国の陸稲(NERICA)栽培適地区分図


多雨年:2006年 第2雨期播種




モザンビーク国の陸稲(NERICA)栽培適地区分図 少雨年:2015年 第1雨期播種




モザンビーク国の陸稲(NERICA)栽培適地区分図 少雨年:2015年 第2雨期播種




ナイジェリア国の陸稲(NERICA)栽培適地区分図 多雨年:2010年 第1雨期播種




ナイジェリア国の陸稲(NERICA)栽培適地区分図 多雨年:2010年 第2雨期播種



ナイジェリア国の陸稲(NERICA)栽培適地区分図 少雨年:2015年 第1雨期播種




ナイジェリア国の陸稲(NERICA)栽培適地区分図 少雨年:2015年 第2雨期播種




セネガル国の陸稲 (NERICA) 栽培適地区分図

多雨年: 2010年 第1雨期播種




セネガル国の陸稲(NERICA)栽培適地区分図

多雨年:2010年 第2雨期播種




セネガル国の陸稲(NERICA)栽培適地区分図

少雨年:2011年 第1雨期播種




セネガル国の陸稲(NERICA)栽培適地区分図

少雨年:2011年 第2雨期播種




シエラレオネ国の陸稲(NERICA)栽培適地区分図

多雨年:2006年 第1雨期播種




シエラレオネ国の陸稲(NERICA)栽培適地区分図

多雨年:2006年 第1雨期播種




シエラレオネ国の陸稲(NERICA)栽培適地区分図


少雨年:2010年 第1雨期播種




シエラレオネ国の陸稲(NERICA)栽培適地区分図 少雨年:2010年 第2雨期播種




タンザニア国の陸稲(NERICA)栽培適地区分図 多雨年:2006年 第1雨期播種




タンザニア国の陸稲 (NERICA) 栽培適地区分図
多雨年: 2006年 第1雨期播種




タンザニア国の陸稲(NERICA)栽培適地区分図 少雨年:2010年 第1雨期播種




タンザニア国の陸稲(NERICA)栽培適地区分図 少雨年:2010年 第2雨期播種




ウガンダ国の陸稲(NERICA)栽培適地区分図 多雨年:2006年 第1雨期播種



ウガンダ国の陸稲(NERICA)栽培適地区分図 多雨年:2006年 第2雨期播種




ウガンダ国の陸稲(NERICA)栽培適地区分図 少雨年:2015年 第1雨期播種




ウガンダ国の陸稲(NERICA)栽培適地区分図


少雨年:2015年 第2雨期播種




ベナン国の陸稲(NERICA)栽培適地区分図 多雨年:2010年 第1雨期播種




ベナン国の陸稲(NERICA)栽培適地区分図 多雨年:2010年 第2雨期播種



ベナン国の陸稲(NERICA)栽培適地区分図 少雨年:2015年 第1雨期播種




ベナン国の陸稲(NERICA)栽培適地区分図 少雨年:2015年 第2雨期播種




ブルキナファソ国の陸稲(NERICA)栽培適地区分図

多雨年:2010年 第1雨期播種




ブルキナファソ国の陸稲(NERICA)栽培適地区分図
多雨年:2010年 第2雨期播種

添付資料—10-13(1)




ブルキナファソ国の陸稲(NERICA)栽培適地区分図


少雨年:2011年 第1雨期播種




ブルキナファソ国の陸稲(NERICA)栽培適地区分図 少雨年:2011年 第2雨期播種




中央アフリカ国の陸稲(NERICA)栽培適地区分図 多雨年:2010年 第1雨期播種



中央アフリカ国の陸稲(NERICA)栽培適地区分図
多雨年:2010年 第2雨期播種



中央アフリカ国の陸稲(NERICA)栽培適地区分図 少雨年:2015年 第1雨期播種



中央アフリカ国の陸稲(NERICA)栽培適地区分図 少雨年:2015年 第2雨期播種

